

## Stadijas

## Pakāpes

### Radioloģiska izmeklēšana

(periapikālas radiogrammas vai OPG)

ja nav iespējams vai ir pieejami tikai BW, aprēķiniem izmanto klīniskā piestiprinājuma zuduma mērījumu vai kaula zudumu no cementa-emaļjas robežas (CEJ)

Interproksimāls kaula zudums  
(izvēlas vietu ar vislielāko periodontīta izraisīto kaula zudumu)

kaula zudums % : pacienta vecums (gados)  
(izmanto vietu ar vislielāko periodontīta izraisīto kaula zudumu)

<15%  
(vai <2mm  
piestiprinājuma  
zuduma no CEJ)

Saknes  
koronālā  
1/3

Saknes  
vidējā  
1/3

Saknes  
apikālā  
1/3

< 0.25

0.25 - 1

>1.0

**I stadija**  
(sākotnējs/  
viegls)

**II stadija**  
(vidējs)

**III stadija**  
(smags)

**IV stadija**  
(ļoti smags)

**Pakāpe A**  
(Lēna  
progresija)

**Pakāpe B**  
(Vidējs  
progresijas  
ātrums)

**Pakāpe C**  
(Ātra  
progresija)

### Periodontīta pašreizējā statusa noteikšana

**Šobrīd stabils**  
Asiņošana zond.<10%  
Zond.dz. ≤4mm  
4mm bez as.zond.

**Šobrīd remisija**  
Asiņošana zond.≥10%  
Zond.dz. ≤4mm  
4mm bez as.zond.

**Šobrīd nestabils**  
Zond.dz. ≥5mm vai  
≥4mm + as.zond.

### Riska faktoru noteikšana

- Piemēram:
- Smēķēšana (cigarettes/dienā)
  - Nepietiekami kontrolēts cukura diabēts

**Diagnozes formulēšana: apjoms - periodontīts - stadija - pakāpe - stabilitāte - riska faktori**  
*piem.: Ģeneralizēts periodontīts III stadijā, B pakāpē, šorīd nestabils, risks(-i)- smēķētājs 15c/d*